



วิธีปฏิบัติงาน		รหัสเอกสาร : WI - IC - 007	
หัวข้อ : การปฏิบัติเกี่ยวกับผ้าเปื้อนในโรงพยาบาล		R 01	วันที่ใช้ : 21/06/64
		หน้าที่ : 1 / 2	

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับผ้าเปื้อนในโรงพยาบาล

๒. เป้าหมาย

บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๓. ผู้รับผิดชอบ

- ๓.๑ หัวหน้าหน่วยงาน
- ๓.๒ พยาบาล
- ๓.๓ พนักงานทำความสะอาด
- ๓.๔ พนักงานซักฟอก

๔. คำจำกัดความ

๔.๑ ผ้าเปื้อนธรรมดา ได้แก่ผ้าที่เปื้อนเหลือโคลอาหาร คราบสกปรกธรรมดาทั่วไป

๔.๒ ผ้าปนเปื้อนเชื้อโรค หรือผ้าติดเชื้อ ได้แก่ผ้าที่เปื้อนเลือด สารน้ำ หรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น หนอง เสมหะ อุจจาระ ปัสสาวะ เป็นต้น และผ้าที่ใช้แล้วสำหรับผู้ป่วยในห้องแยก

๔.๓ สารน้ำและสารคัดหลั่งจากร่างกาย หมายถึง น้ำไขสันหลัง น้ำในช่องท้อง (ascites fluid) น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) น้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial fluid) น้ำคร่ำ (amniotic fluid) น้ำในข้อ (synovial fluid) น้ำอสุจิ (semen) สารคัดหลั่งในช่องคลอด (vaginal secretion) น้ำลาย หนอง เสมหะ อุจจาระ และปัสสาวะ

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ

๕.๑ การแยกประเภทของผ้าเปื้อน

๕.๑.๑ แยกประเภทของผ้าเปื้อนที่แหล่งกำเนิดของผ้าที่ใช้แล้วเป็นผ้าเปื้อนธรรมดาและผ้าเปื้อนเชื้อโรค โดยไม่ต้องตรวจนับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

๕.๑.๒ บรรจุผ้าเปื้อนเลือดใส่ถุงแดง ในกรณีที่มีก้อนอุจจาระ อาเจียน ให้ขจัดออกให้มากที่สุด ก่อนใส่ถุงโดยไม่ต้องซักล้างก่อน

๕.๑.๓ ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งแหลมคมหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นติดไปกับผ้าเปื้อน ก่อนรวมผ้าเปื้อนใส่ในถังผ้ามีฝาปิด

๕.๒ การขนส่งผ้าเปื้อน

๕.๒.๑ ผู้รับและส่งผ้าเปื้อน สวมเครื่องป้องกันร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่เสื้อคลุม ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปาก - จมูก หมวก รองเท้าบูท

๕.๒.๒ ขนย้ายผ้าเปื้อนตามเวลาและเส้นทางที่กำหนด

๕.๒.๓ ขนย้ายผ้าเปื้อนในภาชนะที่ปิดมิดชิด

๕.๓ การซักผ้า

๕.๓.๑ สวมเครื่องป้องกันร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสม (ผ้ากันเปื้อน หรือ เอี๊ยม พลาสติก ถุงมือยาง อย่างหนา ผ้าปิดปาก - จมูก รองเท้าบูท)

๕.๓.๒ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเภทผ้าเปื้อน การซักผ้าเปื้อนเชื้อโรค ปรับอุณหภูมิของน้ำ ให้ได้ระดับ อย่างน้อย 71 องศาเซลเซียส แช่นานอย่างน้อย 25 นาที



วิธีปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร : WI - IC - 007

หัวข้อ : การปฏิบัติเกี่ยวกับผ้าเปื้อนในโรงพยาบาล

R 01 วันที่ใช้ : 21/06/64

หน้าที่ : 2 / 2

ถ้าไม่มีเครื่องซักที่ปรับอุณหภูมิน้ำได้ให้แช่ผ้า ในน้ำยาทำลายเชื้อ

เช่น 0.5% ไฮโปคลอไรท์นาน 30 นาทีก่อนซัก หรือเติมน้ำยาทำลายเชื้อลงใน เครื่องซักผ้า

๕.๓.๓ หลีกเลียงการเทผ้าเปื้อนลงบนพื้น

๕.๓.๔ ในกรณีต้องมีการฉีดล้างสิ่งคัดหลั่งที่ปนเปื้อนก่อนเข้าเครื่องซักผ้า ควรทำในพื้นที่เฉพาะ

๕.๔ การจัดเก็บผ้าสะอาด

๕.๔.๑ พื้นที่พับผ้าควรยกพื้นสูงหรืออยู่บนโต๊ะที่สะอาดและแห้ง

๕.๔.๒ ผ้าที่ผ่านการซัก และทำให้แห้งแล้ว ให้เก็บในตู้หรือชั้นผ้าที่สะอาดและปิดมิดชิด

๕.๕ การขนส่งผ้าสะอาด

๕.๕.๑ ขนส่งผ้าสะอาดโดยการหีบห่อและ / หรือรถขนส่งที่ปิดมิดชิด

๕.๕.๒ รถขนส่งผ้าสะอาดต้องได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก เช็ด/ผึ่ง แห้ง
ก่อนการขนส่งผ้า

๖. เครื่องชี้วัดคุณภาพ

๖.๑ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผ้าเปื้อน

๖.๒ รายงานอุบัติการณ์การไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผ้าเปื้อน